

Sicurezza ambientale

Valutare lo stato di coscienza

Scuotere leggermente sulle spalle e chiamare ad alta voce

Chiamare il 1-1-8 e chiedere il DAE, se non presente

"Non è cosciente: porta il DAE"

Allineare la vittima. Scoprire il torace

Aprire le vie aeree

Mano a C sulla fronte e due dita sotto la punta del mento, sollevare, estendere il capo, guardare in bocca

Valutare la presenza di attività respiratoria e segni di vita


Mantenere le vie aeree aperte, GAS.(guardo ascolto sento), movimenti, tosse, respiro

Confermare assenza circolo a 1-1-8

Iniziare immediatamente Compressioni Toraciche

Mani sovrapposte, dita sollevate e intrecciate, braccia tese e perpendicolari. Profondità delle compressioni 4/5 cm Frequenza delle compressioni 100/min

Posizionare correttamente gli elettrodi



Garantire la sicurezza

Io sono via, voi siete via tutti sono via

Erogare tempestivamente lo shock

Iniziare CT per 2 minuti fino a nuova analisi del ritmo



Basic Life Support e Defibrillazione Esterna Semi-Automatica



Verifica lo stato di coscienza

Scuotere leggermente
Chiedere ad alta voce: "Signore, va tutto bene?"



Se non risponde

Apri le vie aeree e verifica la presenza del respiro

Se non respira normalmente o se il respiro è assente

Se respira normalmente

Chiama il 118, verifica disponibilità DAE



Inizia CPR immediatamente

Appoggiare le mani al centro del petto.
Eseguire 30 compressioni del torace:

- Abbassare il torace di almeno 5 cm ad una velocità di almeno 100/min.
- Continuare la RCP fino all'arrivo del DAE

* Posizione laterale di sicurezza

- Chiamare il 118
- Verificare che la vittima continui a respirare normalmente



Accendere il DAE e posizionare le placche

Seguire le istruzioni vocali impartite dal DAE
Posizionare una placca sotto l'ascella sinistra
Posizionare l'altra placca sotto la clavicola destra, vicino allo sterno
Se più di un soccorritore: non interrompere la RCP



Verificare la sicurezza e, se necessario, erogare la scarica

Nessuno deve toccare la vittima

- durante l'analisi
- durante l'erogazione della scarica

Se la vittima riprende coscienza, si muove, apre gli occhi o torna a respirare, interrompere la CPR. Se è incosciente, metterlo in posizione laterale di sicurezza*